LIBERSPRAY

SPRAY OCULARE OCCHIO APERTO E CHIUSO, ESTRATTO DI MIRTILLO

Soluzione oftalmica sterile lubrificante, idratante e rinfrescante con estratto fluido di mirtillo 0,1% per occhi stanchi. La sua formulazione delicata la rende adatta all'uso anche con lenti a contatto indossate.

INDICAZIONI

Lubrifica e idrata gli occhi stanchi. Indicato per dare sollievo all'occhio, alla palpebra e alla zona perioculare in caso di occhi stanchi e gonfi. L'estratto fluido di mirtillo aiuta ad alleviare la sensazione di affaticamento oculare e contribuisce a mantenere in salute la superfice oculare.

IDEALE ANCHE IN CASO DI

uso prolungato di lenti a contatto; alterazioni non traumatiche e/o non patologiche del film lacrimale; sensazione di secchezza, (ambienti chiusi, fumosi o con aria condizionata ecc.); sensazione di corpo estraneo o fastidio dovuti ad esposizione a sole, vento o polvere, lavoro al computer e guida notturna.

ISTRUZIONI PER L'USO

- agitare prima dell'uso;
- al primo utilizzo premere l'erogatore 3 o 4 volte;
- impugnare fermamente il flacone, porre il pollice sull'erogatore facendo attenzione a non coprire il nebulizzatore con il dito;
- portare il nebulizzatore a circa 10 cm dall'occhio, in posizione laterale;
- se si utilizza il prodotto con gli occhi aperti, continuare a guardare in avanti in modo che il flacone si trovi sul bordo laterale del campo visivo, applicare quindi una pressione decisa sull'erogatore per ottenere una nebulizzazione efficace della soluzione;
- è consigliabile effettuare due nebulizzazioni per ogni nebulizzazione, anche più volte al giorno;
- il prodotto può essere usato anche con lenti a contatto indossate;
- il prodotto può essere utilizzato con occhio aperto o chiuso.

AVVERTENZE

- in caso di irritazione oculare interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista;
- non usare in caso di allergia e ipersensibilità verso i componenti del prodotto;
- non toccare la superficie oculare con il nebulizzatore;
- tenere lontano da fonti di calore, conservare in un luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 e 35 °C;
- non ingerire;
- sterile fino alla prima apertura;
- rimettere il tappo immediatamente dopo l'utilizzo;
- non utilizzare il prodotto se la bottiglia appare danneggiata;
- somministrare il prodotto almeno 5 minuti prima o dopo la somministrazione di altri prodotti oftalmici topici;
- usare entro 90 giorni dalla prima apertura;
- tenere fuori dalla portata dei bambini;
- non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

COMPOSIZIONE

Estratto fluido di mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) 0,1%, disodio edetato, soluzione isotonica tamponata a pH 7,2, PHMB.

CONFEZIONE 10 ml.

LIBERFARMA

Distributore esclusivo: Liberfarma Srl - Firenze